




Résumé

Ce briefing comprend des données du Système National d'Information Sanitaire (SNIS) de la République Démocratique du Congo (RDC) et de quatre des douze bénéficiaires de la planification familiale (PF) de la BMGF en RDC. Il examine les tendances des nouvelles utilisatrices et des utilisatrices de PF, la combinaison de méthodes de PF et les ruptures de stock entre janvier et avril ou mai 2020. En général, les données montrent des diminutions dans la plupart des services de PF (à l'exception des services de PF pour les femmes en post-partum) entre mars et avril 2020 à Kinshasa mais moins au Kongo Central (KC). Cela pourrait être dû au fait que Kinshasa a été affectée par COVID-19 plus tôt que le KC. Cependant, les données du SNIS et des bénéficiaires suggèrent que le nombre de nouvelles utilisatrices de PF parmi toutes les femmes a légèrement augmenté tout en restant assez constant parmi les jeunes. Les données sur les bénéficiaires à Kinshasa suggèrent que les personnes ayant accès à la plupart des méthodes de PF dans les formations sanitaires (FOSA) ont diminué depuis que les premiers cas de COVID-19 ont été détectés en RDC en mars 2020. Selon les données des bénéficiaires, les méthodes de PF distribuées par les distributeurs communautaires (DBC) ont également diminué à Kinshasa entre mars et avril. Les données SNIS présentent une image moins claire, bien qu'elles montrent une diminution du nombre de personnes accédant aux méthodes de PF dans les FOSA de Kinshasa entre mars et avril 2020. Les données sur les bénéficiaires et les données SNIS présentent parfois des tendances différentes, notamment pour les ventes de préservatifs.

Taux de prévalence contraceptive moderne (TPCm)*:

Globalement, le TPCm a augmenté entre janvier et avril 2020, avec une baisse en mars.



*Le TPCm inclut seulement les femmes mariées qui ont reçu les méthodes dans les FOSA ayant rapporté dans le SNIS.

Situation de la COVID-19 en RDC

- ▶ Nbre de cas positifs : 5,477 (4,937 à Kinshasa et 249 au KC)
- ▶ Nbre de décès : 122
- ▶ Nbre de provinces affectées: 11/26
- ▶ Les restrictions de mouvement entre les provinces et à l'intérieur de Kinshasa sont toujours en vigueur

Resumé des données

Lorsque vous comparez les tendances des données de chaque source, veuillez noter les différences géographiques et le nombre de FOSA documentés. Les axes Y ne s'alignent pas entre les graphiques dans la plupart des cas. Autres informations à noter:

Beneficiaire	Nbre de Provinces (26 total)	Nbre de FOSA ayant rapporté (jan. - avril/mai 2020)
SNIS (Gouvernement)	26	17,826-17,993 (DRC) ¹ 963 (Kinshasa) ² 1,389 (KC) ³
AcQual III	2	81 (Kinshasa) ⁴ 34 (KC) ⁵
DKT	18	Données combinées des FOSA et des distributeurs à base communautaire
Engender Health	1	67 (Kinshasa)
Jhpiego	1	16 (Kinshasa)

¹ Taux de rapportage situé entre 95.6 % et 97.9%

² Taux de rapportage situé entre 97.1% et 98.9%

³ 1,427 FOSA en Avril; taux de rapportage situé entre 97.2% et 99.9%

⁴ Rapports manquant de 9 FOSA en Avril

⁵ Rapports manquant de 5 FOSA en Avril




Nouvelles adoptantes de PF

Les données du SNIS montrent une augmentation du nombre de nouvelles utilisatrices de PF (toutes les femmes) en 2020 et une hausse du nombre de nouvelles utilisatrices de PF chez les jeunes en février, mais sinon une tendance plutôt plate. Les tendances de DKT montrent une légère augmentation du nombre d'adoptantes de PF chez les jeunes en mai 2020.

SNIS

SNIS, Jeunes

DKT, Jeunes





Utilisation des méthodes PF, RDC

Les données DKT montrent que l'utilisation d'implants et de DIU a diminué régulièrement entre février et avril, mais a commencé à augmenter en mai pour toutes les femmes. L'utilisation de pilules contraceptives orales (CO) a augmenté régulièrement entre janvier et mars et a diminué en avril et mai chez toutes les femmes, tandis que l'utilisation des CO a augmenté chez les jeunes entre janvier et mai. L'utilisation de contraceptifs injectables et de la contraception d'urgence (CE) est restée stable entre janvier et mai chez toutes les femmes.

DKT, Toutes les femmes

DKT, Jeunes




Conseils en PF et adoption de PF, Kinshasa

Les données de Jhpiego montrent une augmentation du conseil en PF post-partum et de l'adoption de PF * entre janvier et avril (environ un tiers des femmes en post-partum ont adopté une méthode de PF). Cependant, parmi les clientes après avortement, le volume de clientes a diminué de façon notable en avril. Les données d'EngenderHealth montrent également une baisse du nombre de femmes conseillées (et adoptant des méthodes de PF) en avril à Kinshasa.


Jhpiego, Post-partum

Nbre de clientes en post-partum qui ont été conseillées et ont adopté la PF, FOSA Kinshasa




Jhpiego, Post-avortement

Nbre des clientes en post-avortement conseillées et qui ont adopté la PF, FOSA Kinshasa



EngenderHealth

Nbre de clients conseillées et qui ont adopté les méthodes PF, FOSA Kinshasa




*L'adoption de la PF en post-partum inclue la méthode d' aménorrhée de lactation


Utilisation des méthodes PF, FOSA Kinshasa:

Nous constatons une diminution assez constante du nombre d'utilisatrices de la plupart des méthodes modernes à Kinshasa de janvier à avril 2020, avec une diminution notable des utilisatrices entre mars et avril. Cependant, le nombre d'utilisatrices de PF parmi les femmes en post-partum a augmenté au cours de la même période (ce qui peut être dû à l'augmentation du nombre de naissances entre janvier et avril).


SNIS




AcQual III




EngenderHealth



Jhpiego




Condoms




Utilisation des méthodes PF, FOSA Kongo Central:

Les données du SNIS au KC montrent que l'utilisation des injectables a augmenté entre février et avril 2020. Les données d'AcQual III montrent une diminution générale de la plupart des méthodes modernes en 2020, bien que cela puisse être lié à des rapports incomplets des FOSA à Kinshasa et au KC en avril. Il n'y a pas de baisse notable et constante des utilisatrices d'une méthode à l'autre entre mars et avril. Les tendances des préservatifs entre les deux sources ne s'alignent pas.


SNIS



AcQual III



Condoms






Utilisation des méthodes PF, DBC Kinshasa et Kongo Central:

Les données SNIS et AcQual III montrent une baisse de la distribution de la plupart des méthodes de PF par les DBC de mars à avril 2020 à Kinshasa. Au KC, les données disponibles montrent des tendances fluctuantes dans la distribution des méthodes modernes par les DBC, sans schéma cohérent entre les méthodes et sans différence consistante entre mars et avril. Nous constatons des tendances opposées dans les ventes de préservatifs entre les sources de données sur tous les mois à Kinshasa et entre mars et avril au KC.

SNIS

AcQual III




Condoms Kinshasa



SNIS

AcQual III

Condoms KC




Ruptures de stocks*, Kinshasa

Le nombre de FOSA appuyées par EngenderHealth qui ont connu des ruptures de stocks pour chaque méthode à augmenté en mars et avril, avec un plus grand nombre de FOSA ayant déclaré des ruptures de stocks de préservatifs. En avril, les FOSA appuyées par AcQual III ont connu des pics de ruptures de stocks de préservatifs, de Jadelle et de DMPA-SC.


AcQual III, FOSA

% de FOSA rapportant les ruptures de stocks par méthode, Kinshasa




AcQual III, CBD

% de DBC rapportant les ruptures de stocks par méthode, Kinshasa



EngenderHealth, FOSA

Nbre de FOSA avec ruptures de stocks par méthode, Kinshasa




* Rupture de stocks : Le FOSA n'a aucun produit en stock au cours du mois de rapportage ou a épuisé la méthode au cours dudit mois.

Ruptures de stocks, KC

Les FOSA et les DBC ont plus connu des ruptures de stocks de pilules contraceptives orales combinées que toute autre méthode. Le pourcentage de FOSA connaissant des ruptures de stocks de Depo-Provera a diminué entre janvier et avril.


AcQual III, FOSA

% de FOSA rapportant les ruptures de stocks par méthode, KC



AcQual III, CBD

% de DBC rapportant des ruptures de stocks par méthode, KC



Ceci est la deuxième d'une série de mises à jour prévues sur les impacts de la pandémie de COVID-19 sur le portefeuille de planification familiale de la BGMF en RDC. Ces briefings seront produits environ une fois par mois en fonction de la disponibilité et du volume de nouvelles informations. Nous tenons à remercier une fois de plus tous les bénéficiaires du portefeuille PF de la BGMF pour leur flexibilité et leur promptitude à répondre à nos multiples demandes de données.